




BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL: CÓLERA EM ANGOLA

Actualização Semanal – Semana Epidemiológica 13 (23 a 29 março 2025)

INFORMAÇÃO CHAVE

9,643 Cumulativo casos	377 Cumulativo óbitos	+9% Incremento Casos Semanais	1,232 Casos Semanais Reportados (Semana Epidemiológica 13):
17 de 21 Províncias afectadas	234 Casos hospitalizados	55% Casos em Homens	68% Óbitos em Homens
3.9% Taxa de Letalidade	3.5% Taxa de Letalidade Hospitalar	4.7% Taxa de Letalidade Masculina	26.6 Taxa de Ataque por 100,000



DESTAQUE DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Desde janeiro de 2025, Angola tem enfrentado um surto substancial de cólera. Até 29 de março de 2025, um total de **9,643 casos** e **377 óbitos** foram relatados, com um terço das mortes ocorrendo na comunidade. A taxa de letalidade (TL) acumulativa é de **3.9%**.

O surto se espalhou rapidamente para 17 das 21 províncias de Angola, afectando indivíduos de todas as faixas etárias, com a maior carga entre aqueles com menos de 20 anos.

Na última semana epidemiológica número 13 (23 a 29 de março), foram reportados **1,232** novos casos de cólera e **46** óbitos, com a maior parte dos casos acumulados concentrados nas províncias de Luanda, Bengo e Icolo e Bengo. A taxa de letalidade (TL) na semana epidemiológica 13 foi de **4.5%**.





Figura 1. Número de casos de cólera por semana epidemiológica de notificação (n=9,643), até 29 de março de 2025.



A curva epidemiológica mostra o número de casos reportados por semana epidemiológica e indica que nas semanas 12 e 13 houve um incremento no número de casos e mortes reportadas.

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

RESUMO DA SITUAÇÃO DA CÓLERA EM ANGOLA NA ÚLTIMA SEMANA

Na última semana, as províncias que mais casos reportaram foram **Cuanza Norte** com 343 (28%), **Luanda** com 304 (25%) e **Benguela** com 259 (21%). As províncias com maior número de óbitos foram **Benguela** com 23 (42%), **Bengo** com 11 (20%) e **Luanda** com 9 (16%).

Tabela 1: Distribuição dos casos de cólera por província em Angola, Proporção de casos por província na Semana Epidemiológica 13

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 13	Proporção de casos do total reportado na semana 13	Óbitos Semana 13	Proporção de óbitos do total reportado na semana 13
BENGO	2.610	104	152	12%	11	20%
BENGUELA	468	32	259	21%	23	42%
BIE	2	0	0	0%	0	0%
CABINDA	65	1	28	2%	0	0%
CUANZA NORTE	801	40	343	28%	5	9%
CUANZA SUL	48	5	12	1%	2	4%
CUBANGO	2	0	1	0%	0	0%
CUNENE	1	0	0	0%	0	0%
HUAMBO	25	0	2	0%	0	0%
HUILA	7	0	0	0%	0	0%
ICOLO E BENGO	863	23	53	4%	2	4%
LUANDA	4.412	162	304	25%	9	16%
MALANJE	264	8	62	5%	2	4%
UIGE	15	0	0	0%	0	0%
ZAIRE	55	2	11	1%	1	2%
LUNDA SUL	1	0	1	0%	0	0%
NAMIBE	4	0	4	0%	0	0%
ANGOLA	9.643	377	1.232	100%	55	100%

Na Semana Epidemiológica 13 (23 a 29 de Março de 2025), as províncias que apresentaram os maiores aumentos semanais de casos foram **Cuanza Sul** com 12 novos casos (aumento de 300%), e **Benguela** com 259 novos casos (aumento de 154%).

As províncias com os maiores aumentos semanais de óbitos foram **Benguela** com 23 novos óbitos (aumento de 667%), e **Bengo** com 11 novos óbitos (aumento de 175%). A taxa de letalidade mais alta foi registada em **Cuanza Sul** (16,7%), **Zaire** (9,1%), **Benguela** (8,9%) e **Bengo** (7,2%).


Os maiores aumentos na taxa de letalidade foram observados em **Benguela** (incremento de 202%) e **Bengo** (incremento de 180%). **Luanda** reportou, pela segunda semana consecutiva, uma diminuição nos casos e óbitos, com 5% menos casos e 36% menos óbitos em comparação com a semana anterior.

Tabela 2: Distribuição dos casos de cólera por província em Angola, Análise da Semana Epidemiológica 13 (23 a 29 de Março de 2025)

Província	Casos Cumulativos	Óbitos Cumulativos	Casos Semana 13	Mudança Número de Casos Semanais	Óbitos Semana 13	Mudança Número de óbitos Semanais	Taxa de Letalidade % Cumulativa	TL % Semana 13	Mudança TL %
BENGO	2.610	104	152	-2%	11	175%	4.0%	7.2%	180%
BENGUELA	468	32	259	154%	23	667%	6.8%	8.9%	202%
BIE	2	0	0	-100%	0	-	0.0%	-	-
CABINDA	65	1	28	87%	0	-	1.5%	-	-
CUANZA NORTE	801	40	343	-12%	5	-75%	5.0%	1.5%	-72%
CUANZA SUL	48	5	12	300%	2	100%	10.4%	16.7%	-50%
CUBANGO	2	0	1	-	0	-	0.0%	-	-
CUNENE	1	0	0	-	0	-	0.0%	-	-
HUAMBO	25	0	2	-60%	0	-	0.0%	-	-
HUILA	7	0	0	-	0	-	0.0%	-	-
ICOLO E BENGO	863	23	53	-12%	2	0%	2.7%	3.8%	13%
LUANDA	4.412	162	304	-5%	9	-36%	3.7%	3.0%	-32%
MALANJE	264	8	62	-5%	2	0%	3.0%	3.2%	5%
UIGE	15	0	0	-	0	-	0.0%	-	-
ZAIRE	55	2	11	10%	1	-	3.6%	9.1%	-
LUNDA SUL	1	0	1	-	0	-	0.0%	-	-
NAMIBE	4	0	4	-	0	-	0.0%	-	-
ANGOLA	9.643	377	1.232	9%	55	20%	3.9%	4.5%	9%

MAPAS DA INCIDENCIA NA ÚLTIMA SEMANA E TAXA DE LETALIDADE POR PROVÍNCIA EM ANGOLA

Mapas das áreas afetadas pela cólera em Angola na última Semana Epidemiológica 13 (23 a 29 de março de 2025), incluindo a incidência de casos de cólera por 100.000 habitantes por província na última semana epidemiológica 13, a incidência de óbitos na última semana por província e a taxa de letalidade semanal por província




SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR PROVÍNCIA (CUMULATIVO)


Tabela 3. Resumo da situação da cólera em Angola (5 de Janeiro - 29 de Março de 2025), Proporção de casos por província.

Província	Casos Cumulativos	Proporção de Casos do Total	Óbitos Cumulativos	Proporção de óbitos do total	Taxa de Letalidade % Cumulativa
BENGO	2.610	27%	104	28%	4.0%
BENGUELA	468	5%	32	8%	6.8%
BIE	2	0%	0	0%	0.0%
CABINDA	65	1%	1	0%	1.5%
CUANZA NORTE	801	8%	40	11%	5.0%
CUANZA SUL	48	0%	5	1%	10.4%
CUBANGO	2	0%	0	0%	0.0%
CUNENE	1	0%	0	0%	0.0%
HUAMBO	25	0%	0	0%	0.0%
HUILA	7	0%	0	0%	0.0%
ICOLO E BENGO	863	9%	23	6%	2.7%
LUANDA	4.412	46%	162	43%	3.7%
MALANJE	264	3%	8	2%	3.0%
UIGE	15	0%	0	0%	0.0%
ZAIRE	55	1%	2	1%	3.6%
LUNDA SUL	1	0%	0	0%	0.0%
NAMIBE	4	0%	0	0%	0.0%
ANGOLA	9.643	100%	377	100%	3.9%


Angola: Casos cumulativos de cólera
(dados de 29/03/2025)




Angola: Casos cumulativos de cólera por 100,000 habitantes
(dados de 29/03/2025)




Angola: Óbitos cumulativos de cólera (dados de 29/03/2025)



Angola: Óbitos cumulativos de cólera por 100,000 habitantes (dados de 29 de Março 2025)



Angola: Taxa de letalidade cumulativa (dados de 29/03/2025)



DISTRIBUIÇÃO DE CASOS E ÓBITOS POR IDADE E SEXO

Figura 2. Distribuição por idade e sexo dos casos de cólera em Angola (5 de janeiro - 29 de março de 2025).




Tabela 4. Distribuição por idade e sexo dos casos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária

Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Casos Cumulativo	Proporção por faixa etária
0-4	503	698	58%	1201	12%
5-9	621	695	53%	1316	14%
10-14	534	662	55%	1196	12%
15-19	442	599	58%	1041	11%
20-24	441	596	57%	1037	11%
25-29	391	497	56%	888	9%
30-34	319	458	59%	777	8%
35-39	270	308	53%	578	6%
40-44	180	233	56%	413	4%
45-49	130	181	58%	311	3%
50-54	139	132	49%	271	3%
55-59	82	105	56%	187	2%
60-64	97	77	44%	174	2%
65-69	59	45	43%	104	1%
>70	95	54	36%	149	2%
Total	4303	5340	55%	9643	100%

Figura 3. Distribuição por idade e sexo dos óbitos de cólera em Angola (5 de janeiro - 29 de março de 2025).





Tabela 5. Distribuição por idade e sexo dos óbitos, proporção de homens, proporção de casos e taxa de letalidade por faixa etária

Faixa Etária	Femenino	Masculino	Proporção Masculino	Obitos	Proporção por faixa etária	TL% Por Faixa etária
0-4	17	40	70%	57	15%	6%
5-9	17	25	60%	42	11%	4%
10-14	7	16	70%	23	6%	2%
15-19	11	14	56%	25	7%	3%
20-24	7	14	67%	21	6%	2%
25-29	8	19	70%	27	7%	4%
30-34	4	27	87%	31	8%	5%
35-39	8	21	72%	29	8%	6%
40-44	2	16	89%	18	5%	5%
45-49	8	15	65%	23	6%	8%
50-54	14	10	42%	24	6%	11%
55-59	4	10	71%	14	4%	9%
60-64	6	14	70%	20	5%	14%
65-69	4	6	60%	10	3%	11%
>70	10	3	23%	13	3%	10%
Total	127	250	66%	377	100%	4%

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS PROVINCIAS MAIS AFECTADAS


LUANDA

Foi notificado um total de 4.412 casos de cólera com 162 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 3,7%.




CUANZA NORTE

Foi notificado um total de 801 casos de cólera com 40 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 5,0%.




BENGO

Foi notificado um total de 2.610 casos de cólera com 104 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 4,0%.




ICOLO E BENGO

Foi notificado um total de 863 casos de cólera com 23 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 2,7%.




MALANJE

Foi notificado um total de 264 casos de cólera com 8 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 2,7%.



BENGUELA


Foi notificado um total de 468 casos de cólera com 32 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 6,8%.




■ CASOS ■ ÓBITOS TL%

ZAIRE


Foi notificado um total de 56 casos de cólera com 3 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 3,6%.

**CABINDA**


Foi notificado um total de 65 casos de cólera com 1 óbito. A taxa de letalidade cumulativa é de 1,5%.

**CUANZA SUL**

Foi notificado um total de 48 casos de cólera com 5 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 10,4%.

**HUAMBO**

Foi notificado um total de 25 casos de cólera com 0 óbitos. A taxa de letalidade cumulativa é de 0%.



■ CASOS ■ ÓBITOS TL%

Luanda tem reportado um descenso no número semanal de casos por duas semanas consecutivas. **Cuanza Norte** reportou um incremento muito alto na semana epidemiológica 12 e ainda reportou números muito altos na semana epidemiológica 13. Em **Bengo**, a tendência se mantém estável com um ligeiro descenso nesta semana no número de casos reportados, totalizando 152 casos reportados na última semana.

Em **Icolo e Bengo**, na última semana, a taxa de letalidade incrementou em 13%, atingindo 3,8%. **Malanje** tem reportado um alto número de casos e óbitos nas últimas duas semanas, totalizando 62 casos na última semana. **Benguela** tem reportado um incremento no número de casos nas últimas quatro semanas, com um aumento de 154% nos casos reportados e 667% nos óbitos reportados.

Cabinda reportou um incremento no número de casos nas últimas duas semanas. **Zaire**, **Cuanza Sul** e **Huambo** mostraram um decréscimo na última semana.

Tabela 6. Municípios mais afectados na semana epidemiológica 13 (23 a 29 de Março de 2025)

Municípios mais afectados	Província	Município	Casos Semana 13	Óbitos Semana 13	Taxa de Letalidade semanal (TL%)
1	CUANZA NORTE	CAMBAMBE	214	1	0.5%
2	CUANZA NORTE	CAZENGO	75	4	5.3%
3	BENGO	DANDE	56	3	5.4%
4	LUANDA	SAMBIZANGA	56	3	5.4%
5	BENGUELA	LOBITO	48		0.0%
6	BENGUELA	NAVEGANTES	47	14	29.8%
7	LUANDA	CACUACO	44		0.0%
8	BENGUELA	CUBAL	41	1	2.4%
9	LUANDA	KILAMBA KIAXI	38	1	2.6%
10	MALANJE	PUNGO A NDONGO	36	2	5.6%
11	LUANDA	MULENVOS	33		0.0%
12	BENGUELA	BENGUELA	32	5	15.6%
13	CABINDA	CABINDA	28		0.0%
14	ICOLO E BENGO	SEQUELE	28		0.0%
15	BENGUELA	DOMBE GRANDE	26	3	11.5%
16	LUANDA	INGOMBOTA	26	1	3.8%
17	MALANJE	CACUSO	26		0.0%
18	CUANZA NORTE	CERCA	24		0.0%
19	BENGO	UCUA	23	1	4.3%
20	BENGUELA	BOCOIO	21		0.0%
21	LUANDA	VIANA	21	2	9.5%
22	BENGUELA	BAIA FARTA	19		0.0%
23	CUANZA NORTE	MASSANGANO	18		0.0%
24	LUANDA	CAZENGA	18		0.0%
25	BENGO	PANGUILA	17	1	5.9%
26	BENGO	BARRA DO DANDE	15	1	6.7%
27	LUANDA	MAIANGA	14		0.0%
28	BENGO	AMBRIZ	12	1	8.3%
29	BENGO	PIRI	12	1	8.3%
30	BENGUELA	CATUMBELA	12		0.0%
31	LUANDA	BELAS	11		0.0%
32	LUANDA	HOJI YA HENDA	11		0.0%
33	ZAIRE	NZETO	11	1	9.1%
34	BENGO	NAMBUANGONGO	10	2	20.0%
35	BENGUELA	GANDA	10		0.0%
36	CUANZA NORTE	GOLUNGO ALTO	10		0.0%
37	CUANZA SUL	QUILENDA	8	2	25.0%
38	LUANDA	CAMAMA	8		0.0%
39	LUANDA	KILAMBA	8		0.0%
40	ICOLO E BENGO	CABO LEDO	6		0.0%

Municípios mais afectados desde o começo da epidemia 31 de Março de 2025:

Desde o começo da epidemia os municípios mais afetados foram **Cacuaco, Dande, Sequele, Barra do Dande e Hoji ya Henda**. Cacuaco, na província de Luanda, registou 1.521 casos e 28 óbitos, enquanto Dande, na província de Bengo, teve 835 casos e 24 óbitos. Sequele, em Icolo e Bengo, reportou 697 casos e 16 óbitos. Barra do Dande, também na província de Bengo, registou 644 casos e 8 óbitos, e Hoji ya Henda, em Luanda, teve 497 casos e 9 óbitos.

Os municípios com o maior número de óbitos foram **Sambizanga, Cacuaco e Kilamba Kiaxi**, todos na província de Luanda. Sambizanga registou 30 óbitos e 468 casos, com uma taxa de letalidade de 6%. Cacuaco teve 28 óbitos e 1.521 casos, com uma taxa de letalidade de 2%. Kilamba Kiaxi também registou 28 óbitos, mas com 285 casos, resultando em uma taxa de letalidade de 10%. Outros municípios com altos números de óbitos incluem **Úcuá**, na província de Bengo, com 26 óbitos e 479 casos, e **Cazengo**, na província de Cuanza Norte, com 25 óbitos e 350 casos. **Dande**, na província de Bengo, também apresentou um número significativo de óbitos, com 24 óbitos e 835 casos.

Tabela 7. Municípios mais afectados desde o começo da epidemia 31 de Março de 2025:)

Municípios mais afectados	Província	Município	Casos	Óbitos	Taxa de Letalidade %
1	LUANDA	CACUACO	1521	28	2%
2	BENGO	DANDE	835	24	3%
3	ICOLO E BENGO	SEQUELE	697	16	2%
4	BENGO	BARRA DO DANDE	644	8	1%
5	LUANDA	HOJI YA HENDA	497	9	2%
6	BENGO	UCUA	479	26	5%
7	LUANDA	SAMBIZANGA	468	30	6%
8	BENGO	PANGUILA	416	14	3%
9	LUANDA	MULENVOS	416	9	2%
10	CUANZA NORTE	CAZENGO	350	25	7%
11	CUANZA NORTE	CAMBAMBE	322	7	2%
12	LUANDA	KILAMBA KIAXI	285	28	10%
13	MALANJE	MALANJE	264	8	3%
14	LUANDA	VIANA	221	14	6%
15	LUANDA	CAZENGA	202	6	3%
16	MALANJE	PUNGO A NDONGO	173	6	3%
17	LUANDA	MAIANGA	164	6	4%
18	LUANDA	SAMBA	164	8	5%
19	LUANDA	BELAS	134	8	6%
20	LUANDA	INGOMBOTA	127	7	6%
21	BENGO	NAMBUANGONGO	120	23	19%
22	BENGUELA	CUBAL	107	3	3%
23	BENGUELA	LOBITO	99	2	2%
24	BENGO	AMBRIZ	82	5	6%
25	BENGUELA	NAVEGANTES	77	15	19%
26	MALANJE	CACUSO	72	1	1%
27	CABINDA	CABINDA	63	1	2%
28	CUANZA NORTE	GOLUNGO ALTO	58	7	12%
29	LUANDA	MUSSULO	57	3	5%
30	LUANDA	KILAMBA	51	1	2%
31	LUANDA	CAMAMA	50	4	8%
32	ICOLO E BENGO	QUICAMA	49	0	0%
33	ZAIRE	NZETO	49	2	4%
34	CUANZA NORTE	CERCA	46	1	2%
35	BENGUELA	DOMBE GRANDE	44	4	9%
36	BENGUELA	BENGUELA	42	5	12%
37	ICOLO E BENGO	CALUMBO	41	4	10%
38	BENGUELA	GANDA	40	3	8%
39	ICOLO E BENGO	CATETE	39	1	3%
40	LUANDA	TALATONA	39	1	3%