



RAPPORT DE SITUATION DE L'ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA AU TCHAD

N°007

Période du 31 Juillet au 01^{er} Aout 2025




Figure 1 : District sanitaires touchés dans la province affectée au 30 juillet 2025

POINTS SAILLANTS

- 13 juillet 2025 : Notification du 1^{er} cas suspect ;
- 24 juillet 2025 : Mise en évidence du *Vibrio cholerae* O1 Ogawa sur 02 prélèvements à la culture ;
- 01 aout 2025 : Six nouveaux cas suspects et 0 décès enregistrés aux District Sanitaire de Chokoyane et Hadjer Hadjid ;
- Déploiement des équipes du niveau central pour un appui à la délégation affectée ;
- Activation du Système de Gestion de l'incident.

CHIFFRES CLES

- 01 provinces actives : Ouaddaï ;
- 02 District sanitaire actif : Chokoyane et Hadjer Hadjid ;
- 5 FOSA : Dogui, Kaoukaou, Kouchaguine, Malabat, Treguine
- 160 alertes des cas suspects cumulés ;
- 6 échantillons analysés au laboratoire ;
- 03 cas confirmés par culture (50%) ;
- 08 décès dont 3 communautaires pour un taux de létalité de 5% ;
- Age médian : 14
- Sexe ratio F/H : 1,5

COURBE ÉPIDÉMIOLOGIQUE




Figure 2 : Courbe évolutive des cas suspects de choléra au district sanitaire de Chokoyane au 01^{er} aout 2025

Tableau I : Répartition des cas et décès (nouveaux et cumul) de choléra par province au 31 juillet 2025

Province/ district	Cas notifiés		Décès		Taux d'attaque Pour 100 000 Hbts) Population 120 527 250 761	Taux de létalité (%)
	Nouveaux	Cumul	Nouveaux	Cumul		
Ouaddaï /Chokoyane	2	156	0	8	129,4	5
Ouaddaï/ Hadjer Hadjid	4	4	0	0	1,6	0
Total	6	160	0	8	131	5

Source : Liste linéaire Nationale au 31/07/2025




Figure 3 : Répartition des cas de choléra par tranche d'âge et par Sexe au Tchad, au 01/08/2025 (n= 160)

Les femmes sont plus touchées que les hommes (sexe ratio F/H =1,6) et les tranches d'âge les plus affectées demeurent celles des 5-14 ans et 15 à 44 ans qui représentent 73% des cas.




Figure 4 : Répartition des cas de choléra en fonction de l'état de déshydratation au district de chokoyane,/ Hadjer Hadjid au 01/08/2025 (n= 160)

Depuis le début de l'épidémie, 86% des cas arrivent dans les FOSA dans un tableau modéré ou sévère, ce retard au recours aux soins pourrait expliquer la létalité enregistrée.




Figure 5 : Répartition des cas de choléra selon l'évolution au Tchad, au 01/08/2025 (n= 160)

18% des patients sont sous traitement, parmi lesquels il y'a deux femmes enceintes (4,54%)

Tableau II: Données de laboratoire au 01/08/2025

Données laboratoires	Prélèvement	Positif
TDR	114	97
Culture	6	3

Tableau III: Répartition par Formation Sanitaire au 01/08/2025

FOSA	Effectif
Dougui	152
kaoukaou	2
Kouchaguine	1
Malabat	1
Tréguine	4

Coordination

- Tenue de la réunion du sous-coordination ;
- Visite /enquête domiciliaire dans le camp ;
- Elaboration et publication du SITREP 007 du choléra ;
- Tenue de la réunion du sous coordination ;
- Briefing des 14 RSC du chokoyane sur les mesures préventives et prise en charge du choléra ;
- Remise d'eau de javel, fiche d'investigation et plaquette de doxycycline ;
- Réunion de plaidoyer auprès des autorités locales sur la prévention, notamment les attroupements.

Surveillance épidémiologique et laboratoire

- Acheminement de 12 échantillons pour la culture à abéché ;
- Prélèvement des cas à Hadjar hadid et kochaguine.

Prise en charge médicale

- 6 nouvelles admissions ;
- 55 malades au lit avec états stables ;
- 90 sortis guéris.

Prévention et Contrôle des Infections (PCI)

- Evaluation WASH du marché du camp de réfugiés de Dougui ;
- Elaboration d'un nouveau plan de distribution d'eau pour passer de 09 à 15 litres d'eau par personne et par jour ;
- Installation de 10 dispositifs lavage de mains au niveau des restaurants du marché ;
- Mise en place de 34 fontainiers devant les bornes fontaines.

Communication de Risque et Engagement Communautaire (CREC)

- Briefing des relais communautaires sur les techniques de communication sur les risques engagement communautaires ;
- Remise de la fiche de collecte de sensibilisation aux chefs d'équipe ;
- Distribution des dépliants pour la sensibilisation ;
- Focus groupes avec de chefs de blocs sur l'utilisation de latrine
- Organisation des équipes par zone pour la sensibilisation.

Vaccination

- Transmission de la requête ICG pour l'obtention des vaccins contre le choléra.

DEFIS

- Attroupement des réfugiés lors de la distribution des vivres ;
- Insuffisance en moyen roulant pour les équipes mobiles ;
- Insuffisance en ressources humaines pour la prise en charge, la PCI et la surveillance épidémiologique ;
- Insuffisance en doxycycline pour la prise en charge des sujets contacts ;
- Insuffisance en TDR, Equipement de Protection Individuelle (EPI), appareil pulvérisateur et dispositif de lavage de main ;
- Retard dans la mise en place des Centre de traitement du Choléra (CTC) et des Unités de Traitement du Choléra (UTC)
- Consommation de l'eau de surface.

PROCHAINES ETAPES

- Poursuivre le plaidoyer auprès des bailleurs pour la mobilisation des ressources financières ;
- Poursuivre le pré positionnement des médicaments et intrants dans le District Sanitaire en épidémie et dans les Districts Sanitaires à haut risque ;
- Mettre en place des structures d'isolement respectant les normes ;
- Déployer des ressources humaines supplémentaires ;
- Approvisionner le DS de Chokoyane en EPI, appareil pulvérisateur et doxycycline ;
- Doter l'équipe mobile d'une logistique roulante ;
- Aménager le nouveau UTC ;
- Faire un plaidoyer auprès des autorités locales et du CNAAR pour les mesures de prévention notamment lors des attroupements (marché, fontaine, distribution de vivre) ;
- Acheminer les échantillons à Abéché pour la culture ;
- Vaccination dans les camps touchés.

MESSAGES CLES

Le choléra est une maladie dangereuse qui se transmet par l'eau ou les aliments contaminés.

Pour se protéger :

- Lavez toujours les mains avec de l'eau propre et du savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes ;
- Buvez uniquement de l'eau potable ou bouillie ;
- Lavez bien les fruits et légumes avant de les manger ;
- Évitez de manger les aliments vendus dans la rue s'ils ne sont pas bien couverts ou cuits ;
- Gardez votre environnement propre ;
- En cas de diarrhée soudaine, surtout si elle est abondante, liquide et sans fièvre, allez immédiatement au centre de santé le plus proche.



Annexes : images



Figure 1: Réunion de coordination Dougui, 1^{er} Aout 2025



Figure 2: Formation des ASC du 1^{er} juillet 2025



Figure 3 : Formation des équipes pour la sensibilisation 1^{er} Aout 2025



Figure 4 : Opération de désinfection du centre d'isolement, 1^{er} Aout 2025

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

M. Nguetora Guiradoumadji, Incident Manager, Téléphone : +235 66260837, nguetoraguiradoumadji@yahoo.com
Dr Dissia Fittouin, Coordinateur du COUSP ; Téléphone : +235 63300247, dissias@yahoo.fr



Aide humanitaire
et Protection civile